

**INFORMAZIONE E CONSENSO
ALLA INIEZIONE INTRAVITREALE
DI TRIAMCINOLONE ACETATO**

*"il consenso informato
è un atto dovuto
alla moderna etica medica"*

Informazioni in merito al caso clinico del Signor/a
Nato il e residente in
Tel

Lei è affetto/a da una forma di DEGENERAZIONE MACULARE LEGATA ALL'Età di tipo ESSUDATIVO, che si manifesta con una riduzione visiva, spesso grave, conseguente al danno della regione centrale della retina (macula).

Le terapie normalmente utilizzate (trattamento laser, terapia fotodinamica, termoterapia transpupillare) hanno evidenziato risultati scadenti in forme analoghe alla sua.

Sono stati invece riportati, da parte di numerosi autori, risultati utili al fine di rallentare l'evoluzione della malattia dall'uso di cortisone iniettato direttamente all'interno dell'occhio (iniezione INTRAVITREALE di TRIAMCINOLONE ACETATO) eventualmente in combinazione con un'altra delle terapia normalmente utilizzate.

L'iniezione intravitreale con TRIAMCINOLONE ACETATO, seppur in regime ambulatoriale, viene eseguita in sala operatoria, quindi in ambiente sterile e con tutte le precauzioni adottate per ogni intervento oculistico, e in anestesia topica (iniezione di gocce anestetiche). La procedura è usualmente indolore.

Come ogni procedura anche questa non è libera da complicanze che possono essere attribuite all'iniezione stessa ed all'uso di corticosteroidi.

Anche se rarissime le potenziali complicanze possono essere: aumento della pressione endoculare, glaucoma, cataratta, intolleranza individuale al farmaco stesso, emorragie vitreali, distacco di retina, endoftalmiti.

La complicanza più frequente è l'aumento della pressione oculare, usualmente transitorio (alcuni mesi) e ben controllabile con terapia topica (gocce)

La firma di questo documento significa che Lei ha compreso, essendo stato soddisfatto anche ogni Suo ulteriore quesito, ed avendone avuto il tempo necessario, i possibili vantaggi che possono derivare da tale metodica nel Suo specifico caso clinico e gli effetti collaterali e le sequele permanenti che ne possono seguire.

L'oculista Il paziente

ATTO DI CONSENSO

Assunte, comprese e meditate queste informazioni inerenti **l'iniezione intravitreale di triamcinolone acetato** del polo posteriore della retina, i suoi possibili benefici ed i suoi rischi, acconsento a sottopormi a tale terapia dandone pieno mandato ai medici di questa struttura.

Data Il paziente

